

ГЕПАТИТ –

в переводе с латыни означает
«воспаление печени»

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ –

это широко распространенные
инфекционные заболевания
человека, поражающие
преимущественно печень.
Гепатиты по механизмам
заражения и путям передачи
выделяют в две группы:

ГЕПАТИТЫ А И Е,

которые передаются через воду, пищу,
грязные руки, грязные игрушки и т. п.
(фекально-оральный путь передачи).

ГЕПАТИТЫ В, С, D, G,

которые передаются через контакты с
инфицированной кровью (парентеральный
путь передачи), при половых контактах,
а также от матери ребенку во время
беременности и/или родов.

Наиболее опасными являются вирусы
гепатита В и С.

ГЕПАТИТ В –

вирусное инфекционное
заболевание, возбудителем
которого является вирус гепатита
В. Источником инфекции
являются больные в острой и
хронической форме,
а также носители.

ВАКЦИНИРУЮТСЯ ГРУППЫ РИСКА:

- дети, рожденные от матери с Hbs-антигеном;
- дети закрытых учреждений;
- дети, в семьях которых имеются переболевшие или носители;
- дети, заболевания которых предполагают переливания крови и хирургические вмешательства;
- профессиональные группы риска (медики, экстренные службы, военные и др.);
- лица, получающие препараты крови и находящиеся на гемодиализе;
- лица, употребляющие наркотики.

ТЕЛЕФОНЫ

Ханты-Мансийск	8 (3467) 33-09-09
Сургут	8 (3462) 25-07-89
Нижневартовск	8 (3466) 43-30-30
Пыть-Ях	8 (3463) 42-83-62

Дополнительная информация на сайте:

www.aids-86.info



ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В, С

[информация для населения]

ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ:

- парентеральным путем (через кровь);
- через инъекционное оборудование (при использовании одного шприца, как у «внутривенных наркоманов», при пирсинге и нанесении татуировок);
- половым путем – при сексуальном контакте, когда на слизистой половых органов и слизистой оболочки губ и рта имеются эрозии, язвочки, микротрещины и т. п.;
- вертикальным путем – от матери к плоду во время беременности;
- бытовым путем – при пользовании общими бритвами, лезвиями, маникюрными и банными принадлежностями, зубными щетками, полотенцами и т. п.

Вирус присутствует в крови и в различных биологических жидкостях организма – слюне, моче, менструальной крови и др.

Инкубационный период (время с момента заражения до появления симптомов) составляет в среднем 12 недель, но может колебаться в пределах от 2 до 6 месяцев. Инфекционный процесс начинается с момента попадания вируса в кровь. После попадания вируса в печень через кровь идет скрытая фаза размножения и накопления вирусных частиц. При достижении определенной концентрации вируса в печени развивается острый гепатит В. Острый гепатит В нередко переходит в хроническую форму.

ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

безжелтушная и желтушная. Больные в остром периоде опасны для окружающих. Закономерность вирусного гепатита В: чем в более раннем возрасте человек заболевает, тем больше вероятность перехода в хроническую форму.

Симптомы вирусного гепатита В – нарушение детоксикационной функции печени, вследствие развития нарушения оттока желчи.

Профилактика гепатита В как специфическая (вакцинация), так и неспецифическая, направлена на прерывание путей передачи.

ПРОФИЛАКТИКА СПЕЦИФИЧЕСКАЯ

это вакцина против гепатита В. Курс состоит из трех доз, вводимых внутримышечно. Между 1-й и 2-й дозой временной интервал составляет 7 дней, между 2-й и 3-й – 14 дней. Ревакцинация однократная.

ПРОФИЛАКТИКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ:

- не допускайте немедикаментозного потребления наркотиков;
- используйте разовый инструментарий при пирсинге, татуаже;
- защищенный секс (использование презервативов при половых контактах);
- наличие единственного здорового сексуального партнера;
- тщательно соблюдайте правила гигиены в быту.

ГЕПАТИТ С –

вирусное заболевание, наиболее тяжелая форма вирусного гепатита.

По другому гепатит С называют «ласковым убийцей» из-за его способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний.

Источником инфекции являются больные с активной формой гепатита С и латентные больные – носители вируса. **Путь передачи** – через инфицированную кровь и ее компоненты, половой путь, от матери к ребенку, а также через нестерильное инъекционное оборудование: шприцы, оборудование для пирсинга и нанесения татуировок.

Инкубационный период, т. е. период от момента заражения до клинических проявлений составляет от 2 до 26 недель. В большинстве случаев никаких клинических проявлений болезни при первичном заражении не возникает и человек долгие годы не подозревает, что болен, но при этом является источником заражения. Часто люди узнают о том, что они являются переносчиком вируса гепатита С, при сдаче анализа крови в ходе обычного медицинского обследования или при попытке сдать кровь в качестве донора.

В случае острого начала болезни начальный период длится 2-3 недели и сопровождается суставными болями, слабостью и расстройством пищеварения, подъем температуры отмечается редко. Желтуха малохарактерна для гепатита С. При хронической форме чаще других симптомов отмечаются психическая депрессия и постоянная усталость. Наибольшую опасность представляет хроническая форма, которая нередко переходит в цирроз и рак печени. Хроническое течение развивается примерно у 90% взрослых и до 20% детей.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРЕРЫВАНИИ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С:

- не допускайте немедикаментозного потребления наркотиков;
- используйте разовый инструментарий при пирсинге, татуаже;
- защищенный секс (использование презервативов при половых контактах);
- наличие единственного здорового сексуального партнера;
- тщательно соблюдайте правила гигиены в быту.